- Copyright - Il Pensiero Scientifico Editore downloaded by IP 216.73.216.204 Sat, 12 Jul 2025, 04:11:18

Lo studio TAPAS
G Ital Cardiol 2008; 9 (8): 521-525

Si specifica che gli autori del lavoro sono i seguenti:
Luca Favero, Bernhard Reimers, Massimo Napodano

* * *

La selezione e l'impiego ottimale del mezzo di contrasto
G Ital Cardiol 2009; 10 (2): 79-87

L'autore comunica le seguenti modifiche:

Tabella 2
- alla voce Jackson sostituire Iodixanolo 300 con Iodixanolo **320**
- alla voce Wessely sostituire Iomeprol con **Iomeprolo 350**
- alla voce Thomsen sostituire Iomeptrol 400 con **Iomeprolo** 400

Testo
- pag. 81, prima colonna, riga 10, sostituire IOCM con LOCM, come segue:
  "Nella prima fase di distribuzione, l'aumento dell'osmolarità per gli HOCM e **i LOCM** ..."
- pag. 82, seconda colonna, riga 29, sostituire IOCM con LOCM, come segue:
  "È possibile che l'aumentata viscosità ed il rallentato transito dell'IOCM, di classe 6, possa essere la causa della maggiore vacuolizzazione e captazione nelle cellule del tubulo rispetto **ai LOCM** e HOCM"
- pag. 84, prima colonna, riga 49, sostituire iodixanol 534 con iodixanolo 5.34, come segue:
  "L'incidenza di eventi maggiori intraospedalieri era più bassa nel gruppo trattato con **iodixanolo** (**5.34** vs 9.5%; p <0.027)"

* * *

Documento di Consenso della Federazione Italiana di Cardiologia
Sindromi coronariche acute senza sopraslivellamento del tratto ST
G Ital Cardiol 2009; 10 (Suppl 1-6): 3S-43S

Nella Tabella di pag. 29S, il corretto Livello di evidenza I è **I-A**. Si riporta integralmente la Tabella con la debita correzione.

Inibitori delle GPIIb/IIIa	Livello di evidenza I	Livello di evidenza II
Indicazioni cliniche	Strategia invasiva urgente[a] (abciximab) **(I-A)**	Strategia invasiva urgente[a] (eptifibatide o tirofiban) (IIa-B) Strategia invasiva precoce (eptifibatide o tirofiban) (IIa-A)
In caso di angiografia/angioplastica		Mantenere l'infusione (eptifibatide o tirofiban) (IIa-B)

[a]in questo caso si intendono tutte le condizioni nelle quali il trattamento viene effettuato in sala di emodinamica e non è stato iniziato *upstream*.